

## **SYNDROME PIEDS-MAINS-BOUCHE (Coxsackie)**

<b>TABLEAU CLINIQUE</b>	<p>Souvent asymptomatique.</p> <p>Maladie qui se caractérise par de petites vésicules surtout localisées aux faces dorsales et palmo-plantaires des mains et des pieds. On peut avoir des lésions maculo-papulaires au niveau des fesses. On peut aussi avoir des ulcérations au niveau de la bouche, de la fièvre, des malaises généraux, de l'irritabilité, de l'anorexie et de la diarrhée.</p> <p>La maladie dure en général moins de 10 jours.</p>
<b>EXCLUSION</b>	<p>Aucune.</p>
<b>MODE DE TRANSMISSION</b>	<p>Par <b>contact direct</b> avec les sécrétions nasopharyngées ou les selles de la personne infectée, ou par <b>l'inhalation</b> de gouttelettes contaminées en présence d'une personne qui tousse ou éternue, ou par <b>contact indirect</b> avec des objets contaminés par les sécrétions nasopharyngées ou les selles d'une personne infectée.</p>
<b>PÉRIODE D'INCUBATION</b>	<p>De 3 à 6 jours.</p>
<b>PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ</b>	<p>Durant la phase aiguë de la maladie, le virus peut être excrété dans les selles pendant 8 à 12 semaines.</p>
<b>DIAGNOSTIC</b>	<p>Par examen clinique.</p>
<b>GROSSESSE (mère du cas)</b>	<p>Risque de myocardite ou d'encéphalite chez le nouveau-né si on trouve le virus dans le sang de la mère en fin de grossesse.</p>
<b>TRAITEMENT</b>	<p>Aucun traitement spécifique.</p>
<b>RECOMMANDATIONS</b>	<p>Respect strict des mesures d'hygiène en ce qui a trait aux selles et aux sécrétions nasopharyngées.</p>

